


26655-2023



Листок-вкладыш – информация для потребителя
ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД,
40 мг/мл, капли для приема внутрь спиртовые
(Гинкго билоба листьев экстракт/ Ginkgo folium)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД
3. Применение препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД,
и для чего его применяют**

Препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД содержит стандартизованный экстракт из листьев Гинкго билоба. Прием экстракта приводит к повышению активности по результатам электроэнцефалографии, снижению вязкости крови и агрегации тромбоцитов, повышению кровотока в отдельных областях головного мозга, повышению кровотока в кровеносных сосудах конечностей.

Препарат применяется только у взрослых.

Препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД можно использовать для симптоматического лечения когнитивных расстройств легкой степени тяжести (например, ослабление памяти, внимания, снижение способности к концентрации внимания) у пациентов пожилого возраста.

После консультации с врачом препарат также используется для симптоматического лечения начальных нарушений периферического кровообращения нижних конечностей в составе комплексной терапии.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД**

Не применяйте препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД, если:

- у вас аллергия на экстракт листьев Гинкго билоба или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- вы беременны или кормите грудью;
- вам меньше 18 лет;
- у вас острое нарушение мозгового кровообращения;
- у вас острый инфаркт миокарда;
- у вас язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также эрозивный гастрит.

Если вы не уверены, относится ли к вам что-либо из перечисленного выше, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у вас ранее были или есть какие-либо заболевания печени, алкоголизм;
- у вас эпилепсия и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога;
- у вас повышенный риск возникновения кровотечения (например, геморрагический диатез);
- вы принимаете антикоагулянтные или антиагрегантные препараты (например, фенпрокумон, варфарин, клопидогрел, ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные препараты);
- вы принимаете эфавиренз;
- вы принимаете нифедипин;
- вы принимаете какие-либо другие лекарственные препараты;
- вам предстоит хирургическое вмешательство.

Если вы не знаете или не уверены, относится ли к вам что-либо из перечисленного выше, обратитесь к лечащему врачу перед применением препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД. До приема лекарственного препарата врачу необходимо удостовериться, что расстройства, указанные в разделе 1. «Что из себя представляет препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД, и для чего его применяют», не являются результатом другого заболевания, требующего назначения других лекарственных препаратов.

Данный препарат не предназначен для лечения высокого артериального давления.

Если во время приема лекарственного препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, обратитесь к лечащему врачу (см. раздел 3. «Применение препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД»).

Дети и подростки

Не давайте раствор ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД детям в возрасте до 18 лет, так как отсутствуют достаточные данные о применении у детей и подростков, кроме того, препарат содержит этиловый спирт.

Другие препараты и препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится также к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы приобрели без назначения врача.

Очень важно сообщить вашему лечащему врачу, если вы применяете лекарственные препараты, перечисленные ниже:

- любые другие препараты, на эффект которых может влиять этиловый спирт, присутствующий в препарате ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД. Ваш лечащий врач знает, какие это препараты. К данным препаратам относятся, например, **лекарственные препараты, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию** (возникновение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф (антибактериальные препараты группы цефалоспоринов), хлорамфеникол (антибактериальный препарат), хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид (антидиабетические гипогликемические препараты, производные сульфонилмочевины), гризеофульвин (противогрибковый препарат), нитро-5-имидазолы (метронидазол, орнидазол, секнидазол, тинидазол), кетоконазол (противогрибковый препарат), прокарбазин (цитостатический препарат); **лекарственные препараты, угнетающие функции центральной нервной системы**;
- другие лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт;
- лекарственные препараты, угнетающие свертывание крови (антикоагулянты, например, фенпрокумон, варфарин), а также угнетающие агрегацию тромбоцитов (антиагреганты, например, клопидогрел, ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные препараты). Ваш лечащий врач знает, какие это препараты. Применение препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД с указанными выше препаратами может привести к усилению их действия и развитию кровотечений;
- лекарственные препараты, в метаболизме которых участвует Р-гликопротеин. Ваш лечащий врач знает, какие это препараты (например, дабигатран);
- нифедипин. Применение препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД и нифедипина сопровождается головокружением и усилением «приливов»;
- эфаверенз.

Если вы принимаете варфарин, ваш врач назначит вам проведение дополнительных анализов для контроля параметров свертывания крови в начале приема, при изменении дозы, при завершении приема или замене препарата гинкго билоба.

Препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД с пищей, напитками и алкоголем

Лекарственный препарат принимают во время еды, разводя в половине стакана воды. Необходимо избегать одновременного применения с алкоголем.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препараты гинкго билоба могут нарушить способность тромбоцитов к агрегации. Возможно повышение риска кровотечения. Применение лекарственного препарата противопоказано при беременности.

В связи с отсутствием достаточных данных лекарственный препарат не рекомендован для приема во время кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Этиловый спирт, содержащийся в данном лекарственном препарате, может повлиять на вашу способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. В период применения препарата воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД содержит этиловый спирт

Лекарственный препарат содержит не менее 65,0% (об/об) этанола, что соответствует 513 мг на дозу (1 мл, 25 капель), что равно 13 мл пива или 5,4 мл вина на дозу. Препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД вреден для лиц с алкоголизмом.

Наличие этилового спирта необходимо учитывать беременным и кормящим женщинам, детям и группам высокого риска, таким как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсией. Этиловый спирт, содержащийся в данном лекарственном препарате, может повлиять на эффект других лекарственных препаратов.

3. Применение препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Режим дозирования и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата.

1 мл лекарственного препарата содержит 40 мг экстракта (25 капель).

Симптоматическое лечение когнитивных расстройств

Рекомендуемая доза экстракта составляет от 120 мг (75 капель) до 240 мг (150 капель) в сутки, разделенная на 2-3 приема (например, по 25 капель 3 раза в сутки или по 75 капель 2 раза в сутки), по указанию лечащего врача. Рекомендуется прием в течение не менее 8 недель.

Если ваши симптомы ухудшаются или не улучшаются в течение 3 месяцев приема препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не принимайте препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД более 3 месяцев без консультации с лечащим врачом.

Симптоматическое лечение начальных нарушений периферического кровообращения нижних конечностей

Рекомендуемая доза составляет 120 мг (75 капель) в сутки, разделенная на 2-3 приема, по указанию лечащего врача. Рекомендуется прием в течение не менее 2 недель.

Если ваши симптомы ухудшаются или не улучшаются в течение 2 недель приема препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не принимайте препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД более 2 недель без консультации с лечащим врачом.

Способ применения

Лекарственный препарат принимают во время еды. Рекомендуемую дозу капель разводят в половине стакана кипяченой воды комнатной температуры. Принимают разбавленный раствор. Приготовленный раствор хранению не подлежит. Его следует принять сразу после приготовления.

Если вы применили препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД больше, чем следовало

В случае передозировки или случайного проглатывания ребенком немедленно обратитесь к врачу.

Если вы пропустили прием препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД

- Если вы забыли принять дозу, примите ее как можно быстрее. Однако если наступило время для приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу и продолжайте принимать препарат, как и обычно.
- Не принимайте двойную дозу препарата (две дозы в одно и то же время), если вы пропустили прием.

При наличии вопросов по применению препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД, обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Могут возникать следующие нежелательные реакции:

Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10):

- головная боль.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- диарея, боли в животе, тошнота, рвота.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- развитие кровотечений различной локализации (глазные, носовые, церебральные, желудочно-кишечные и др.);
- обморок;
- реакции гиперчувствительности (аллергический шок);
- аллергические кожные реакции (эритема, отек, зуд, сыпь).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Беречь от огня.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не применяйте препарат, если вы заметили, что флакон, в котором находится раствор, поврежден.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения


Действующим веществом в 1 мл (25 капель) препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД является 40 мг сухого экстракта высушенных листьев Гинкго билоба (35 – 67:1) (экстрагент: ацетон 60 %), стандартизированный до 24 % гинкгофлавоноидов и 6 % терпеновых лактонов.

Вспомогательным веществом является этанол (этиловый спирт) 70 %.

Лекарственный препарат содержит не менее 65,0 % (об/об) этанола.

НД РБ

2665Б-2023



Внешний вид препарата ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД и содержимое упаковки
ГИНКГО БИЛОБА-БЕЛМЕД, капли для приема внутрь спиртовые, 40 мг/мл – прозрачная жидкость коричневого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения возможно появление осадка.

По 50 мл во флаконах из светозащитного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

По 50 мл во флаконах из светозащитного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками укупорочно – навинчиваемыми с контролем первого вскрытия.

Флакон с этикеткой самоклеящейся вместе с листком-вкладышем помещен в пачку из картона. Флаконы с этикеткой многостраничной помещены в ящики из гофрированного картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.