

Листок-вкладыш – информация для потребителя БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА, настойка

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в ней содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание инструкции по медицинскому применению

1. Что собой представляет препарат БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА
3. Применение препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что собой представляет препарат БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА, и для чего его применяют

БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА является средством растительного происхождения. Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника, оказывают умеренное кардиотоническое, гипотензивное, спазмолитическое, седативное действие, урежают частоту сердечных сокращений, способствуют улучшению коронарного кровообращения.

Применяется в комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности, астено-невротических состояний.

2. О чем следует знать перед применением препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Препарат БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА имеет следующие противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата;
- детский возраст до 12 лет;
- беременность и период лактации.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу перед началом приема препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом приема препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат содержит этанол!

Лекарственный препарат содержит не менее 65,0 % (об/об) этанола, т.е. до 554-831 мг на разовую дозу 20-30 капель соответственно, что эквивалентно от 12,31 г до 18,47 г пива или от 5,54 г до 8,31 г вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом.

Сообщите лечащему врачу перед началом лечения препаратом БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА о следующих нарушениях или заболеваниях:

- заболевания печени;
- эпилепсия;
- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга.

Сообщите врачу, если во время лечения у вас симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния.

Дети и подростки

Противопоказано применение у детей младше 12 лет. Применение лекарственного препарата у детей в возрасте 12-18 лет возможно только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

Другие препараты и препарат БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без назначения врача.

Препарат содержит этанол. Необходимо избегать совместного приема с препаратами, вызывающими дисульфирамоподобную реакцию при приеме с алкоголем (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия):

- дисульфирам (препарат для лечения алкоголизма);
- антибиотики (цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол);
- препараты, снижающие уровень сахара в крови (хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид);
- противогрибковые препараты (гризеофульвин, кетоконазол);
- противомикробные препараты, производные нитро-5-имидазола (например, метронидазол, орнидазол, тинидазол);
- прокарбазин (противоопухолевый препарат).

Необходимо также избегать совместного приема с лекарственными препаратами, угнетающими функции центральной нервной системы.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол.

При совместном назначении с сердечными гликозидами происходит усиление кардиотонического эффекта; с бета-адреноблокаторами – гипотензивного эффекта.

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса, а также с цизапридом.

Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования комплексов.

Прием препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА с пищей, напитками и алкоголем

В период лечения следует избегать употребления алкоголя и алкогольсодержащих напитков.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Противопоказано применение препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА во время беременности и в период грудного вскармливания.

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем принимать данный препарат. В период лечения приостанавливают грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА содержит этанол. В период лечения откажитесь от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Режим дозирования и длительность лечения устанавливается в зависимости от состояния и возраста.

Обычная доза для взрослых – по 20-30 капель настойки, разведенных в ¼ стакана воды, 3 раза в день. Внутрь, за 30 минут до еды.

Не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени из-за содержания этанола. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих препаратов.

Применение у пожилых пациентов

С осторожностью.

Применение у лиц с нарушенной функцией почек

Не изучены.

Применение у лиц с нарушенной функцией печени

С осторожностью.

Применение у детей и подростков

Не рекомендовано детям младше 12 лет. Детям с 12 лет из расчета одна капля на год жизни. Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени из-за содержания этанола. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Применение лекарственного препарата у детей в возрасте 12-18 лет возможно только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

Если вы приняли больше, чем назначено

Если вы приняли больше назначенной дозы препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА, возможно снижение артериального давления, головокружение, сонливость, брадикардия. Следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Лечение симптоматическое.

Если вы забыли принять препарат БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Не следует принимать двойную дозу (две дозы в одно время), чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

Если вы прекратите прием препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Обратитесь за консультацией к лечащему врачу, если вы хотите прекратить прием препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА раньше, чем рекомендовано.

Если у вас есть любые дополнительные вопросы об использовании этого лекарственного препарата, обратитесь к своему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций:

- головокружение, тремор, сонливость;
- аллергические реакции: редко – крапивница, зуд;
- брадикардия (при длительном применении);
- снижение артериального давления (при применении в больших дозах).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Беречь от огня.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Не выбрасывать препарат в канализацию. Уточнить у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один флакон 30 мл:

Активный компонент: боярышника плоды – 3 г; *вспомогательное вещество:* этанол (этиловый спирт) 70 % – до 30 мл настойки.

Состав на один флакон 50 мл:

Активный компонент: боярышника плоды – 5 г; *вспомогательное вещество:* этанол (этиловый спирт) 70 % – до 50 мл настойки.

Внешний вид препарата БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА и содержимое упаковки

БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА представляет собой прозрачную жидкость от коричневатого-желтого до красно-коричневого цвета с ароматным запахом. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками укупорочно – навинчиваемыми с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон с этикеткой самоклеящейся вместе с листком - вкладышем помещен в пачку из картона. Флаконы с этикеткой многостраничной помещены в ящики из гофрированного картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: