

Листок-вкладыш – информация для потребителя

Димексид-Белмед, жидкость для наружного применения

Действующее вещество: диметилсульфоксид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Димексид-Белмед, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Димексид-Белмед.
3. Применение препарата Димексид-Белмед.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Димексид-Белмед.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Димексид-Белмед, и для чего его применяют

ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД является лекарственным препаратом для наружного применения, который обладает противовоспалительными, болеутоляющими, противомикробными и фибринолитическими (способствует разжижению крови) свойствами.

Показания к применению

Препарат ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД применяется у взрослых пациентов и детей в возрасте от 12 лет в составе комплексной терапии:

- заболеваний опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, деформирующий остеоартроз (при наличии поражения периартикулярных тканей), артропатия, радикулит);
- ушибов, повреждения связок, воспалительных отеков, травматических инфильтратов, гнойных ран, ожогов, абсцессов;
- узловатой эритемы, экземы, рожистого воспаления, трофических язв, тромбоза, тромбоза, акне, пиодермии, стрептодермии, фурункулеза, фолликулитов, склеродермии;
- в кожно-пластической хирургии (приживление пересаженных кожных ауто- и гомотрансплантатов; консервирование кожных гомотрансплантатов).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Димексид-Белмед

Противопоказания

Не применяйте препарат Димексид-Белмед:

- если у Вас аллергия на диметилсульфоксид;
- при тяжелом нарушении функции печени и/или почек;
- при выраженном атеросклерозе;
- при стенокардии (резкая боль или дискомфорт в области груди, вызванные недостатком кровоснабжения в определенном участке сердца);
- при глаукоме (заболевание глаза, при котором повышается внутриглазное давление);
- при катаракте (помутнение хрусталика глаза);
- при инфаркте миокарда (острое состояние, которое возникает в результате повреждения или отмирания части сердечной мышцы);
- при инсульте (заболевание, при котором по тем или иным причинам нарушается кровоснабжение определенного участка мозга);
- при коме (угрожающее жизни состояние с отсутствием сознания и реакций на любые раздражители);
- если Вы беременны или кормите ребенка грудным молоком;
- у детей в возрасте до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Димексид-Белмед проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у Вас тяжелые аллергические заболевания;
- у Вас ишемическая болезнь сердца;
- Вы применяете или недавно применяли какой-либо другой препарат, включая препараты, которые отпускаются без рецепта врача.

Не наносите водный раствор диметилсульфоксида на открытые раны и кожу с проявлениями аллергии.

Не наносите водный раствор диметилсульфоксида в концентрации более 20% на кожу лица.

Избегайте попадания лекарственного препарата на слизистую оболочку и в глаза. При случайном попадании Вы должны немедленно промыть водой.

Перед началом применения лекарственного препарата Ваш лечащий врач может провести тест на лекарственную непереносимость препарата Димексид-Белмед. Если результаты теста будут неудовлетворительными, то данный препарат Вам применять нельзя.

При возникновении аллергических реакций на препарат Димексид-Белмед Вы должны прекратить применение лекарственного препарата и немедленно обратиться к врачу.

Дети и подростки

Применение препарата Димексид-Белмед противопоказано у детей до 12 лет.

Другие препараты и препарат Димексид-Белмед

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Некоторые препараты можно применять совместно с препаратом Димексид-Белмед, а другие – могут вызывать нежелательные реакции при применении с препаратом Димексид-Белмед.

Препарат Димексид-Белмед может усиливать всасывание и повышать эффективность перечисленных ниже лекарственных препаратов для местного применения:

- гепарин;
- нестероидные противовоспалительные препараты;
- противомикробные препараты: аминогликозиды, бета-лактамы, антибиотики, хлорамфеникол, рифампицин, гризеофульвин (повышается чувствительность микроорганизмов к данным препаратам);
- этанол;
- инсулин;
- препараты для общей и местной анестезии.

Лечащий врач решит, следует ли применять препарат Димексид-Белмед в сочетании с этими и другими лекарственными препаратами.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата во время беременности и кормления грудью противопоказано. На время лечения препаратом кормление грудью следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Димексид-Белмед не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

3. Применение препарата Димексид-Белмед

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Лекарственный препарат предназначен только для наружного применения у взрослых и детей старше 12 лет.

При нанесении на лицо следите, чтобы препарат не попадал в глаза.

Рекомендуемая доза

При применении в виде аппликаций и орошений (промываний) в растворе необходимой концентрации смачивают марлевые салфетки и накладывают на пораженные участки в течение 20-30 мин. Поверх салфетки накладывается полиэтиленовая пленка и хлопчатобумажная или льняная ткань. Длительность аппликаций – 10-15 дней.

При лечении рожи и трофических язв – в виде 30-50 % раствора в воде по 50-100 мл 2-3 раза в сутки.

При экземе, стрептодермиях – компрессы с 40-90 % раствором в воде.

Для местного обезболивания при болевых синдромах – 25-50 % раствор в воде в виде компрессов по 100-150 мл (в зависимости от обрабатываемой площади) 2-3 раза в день.

Для кожи лица и других высокочувствительных областей применяют 10-20-30 % растворы в воде.

В кожно-пластической хирургии используют повязки с 10-30 % раствором на пересаженные кожные ауто- и гомотрансплантаты непосредственно после операций и в последующие дни послеоперационного периода до стойкого приживления трансплантата.

В кожно-пластической хирургии в качестве консервирующей среды для хранения кожных гомотрансплантатов применяют 5 % раствор в растворе Рингера.

Менее концентрированными растворами производят промывание гнойно-некротических и воспалительных очагов и полостей.

Применение у детей и подростков

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

У детей 12-18 лет применяют 20-30 % водные растворы препарата Димексид-Белмед.

Путь и (или) способ введения

Только для наружного применения, в виде аппликаций и орошений (промываний).

Димексид-Белмед выпускается в виде концентрата, из которого перед применением готовят раствор необходимой концентрации.

Рекомендации по применению препарата Димексид-Белмед:

1. Приготовить водный раствор препарата Димексид-Белмед, руководствуясь следующей таблицей:

Содержание диметилсульфоксида	Количество частей диметилсульфоксида	Количество частей воды
10 %	1	9
20 %	1	4
25 %	1	3
30 %	3	7
40 %	2	3
50 %	1	1
90 %	9	1

2. В растворе необходимой концентрации смочить марлевую салфетку и наложить ее на пораженный участок на 20-30 мин. Компресс следует накладывать на пораженные участки, захватывая прилегающие здоровые кожные покровы.
3. Поверх салфетки наложить полиэтиленовую пленку и хлопчатобумажную или льняную ткань.

Изменять способ применения при необходимости может только лечащий врач.

Продолжительность терапии

Продолжительность применения препарата Димексид-Белмед устанавливается лечащим врачом в зависимости от особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости. Рекомендуемая длительность курса лечения – 10-15 дней.

Если Вы применили препарата Димексид-Белмед больше, чем следовало

Если Вы получили слишком большую дозу препарата Димексид-Белмед, у Вас могут возникнуть следующие симптомы:

- повреждение желудочно-кишечного тракта,
- сонливость,
- головная боль,
- любые другие нежелательные реакции, перечисленные в разделе 4.

Если Вы считаете, что получили слишком большую дозу препарата Димексид-Белмед, прекратите применение препарата, промойте поврежденное место водой и обратитесь к врачу. Вам будет назначено симптоматическое лечение.

При случайном приеме лекарственного препарата внутрь промойте желудок и немедленно обратитесь к врачу. Помните, что диметилсульфоксид быстро всасывается.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Димексид-Белмед может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите применение препарата Димексид-Белмед и обратитесь к врачу, если у Вас наблюдаются следующие нежелательные реакции:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- бронхоспазм (сужение дыхательных путей, которое сопровождается затруднением дыхания, удушьем и учащенным сердцебиением).

При применении препарата Димексид-Белмед также могут возникать следующие нежелательные реакции:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- аллергические реакции;
- жжение;
- зудящий дерматит;
- эритема (покраснение кожи);
- ощущение сухости кожи;
- усиление пигментации кожи;
- бессонница;
- чесночный запах выдыхаемого воздуха;
- тошнота, позывы на рвоту (некоторые пациенты плохо воспринимают запах препарата, что может сопровождаться тошнотой, позывами на рвоту).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29; факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

<https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Димексид-Белмед

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

При хранении при температуре 18 °С и ниже возможна кристаллизация диметилсульфоксида, которая не влияет на качество лекарственного препарата. Для расплавления кристаллов следует разогреть флакон с лекарственным средством в емкости с водой (температура воды – около 40 °С).

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожить) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Препарат Димексид-Белмед содержит

Действующим веществом является диметилсульфоксид.

Каждый флакон объемом 50 миллилитров или 100 миллилитров содержит действующее вещество: диметилсульфоксид – 55,0 грамм или 110,0 грамм соответственно.

Прочие ингредиенты (вспомогательные вещества) отсутствуют.

Внешний вид препарата Димексид-Белмед и содержимое упаковки

Димексид-Белмед, жидкость для наружного применения, представляет собой бесцветную жидкость или бесцветные кристаллы. Гигроскопичен.

Димексид-Белмед выпускается по 50 мл или по 100 мл во флаконах стеклянных вместимостью 50 мл или 100 мл соответственно, укупоренных пробками резиновыми и обкатанных колпачками алюминиевыми или алюминиевыми/пластиковыми, или по 50 мл или по 100 мл во флаконах стеклянных с винтовой горловиной вместимостью 50 мл или 100 мл соответственно, укупоренных пробками с уплотнительным элементом и крышками навинчиваемыми. На флаконы наклеивают этикетки самоклеящиеся. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещен в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

РУП «Белмедпрепараты»,

220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,



тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com

За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.