

Листок-вкладыш – информация для потребителя

Цилапенем, 250 мг+250 мг или 500 мг+500 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий

Действующие вещества: Имипенем+циластатин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Цилапенем, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Цилапенем.
3. Применение препарата Цилапенем.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Цилапенем.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Цилапенем, и для чего его применяют

Препарат Цилапенем содержит два разных действующих вещества, которые называются имипенем и циластатин. Имипенем является антибиотиком и работает, убивая бактерии, вызывающие инфекции. Он относится к группе препаратов, называемых «карбапенемами», действие которых иногда можно остановить (сделать неактивными). Другое действующее вещество препарата (циластатин) препятствует этому.

Показания к применению

Препарат Цилапенем показан взрослым и детям в возрасте от 1 года и старше для лечения следующих инфекций:

- осложненные инфекции органов брюшной полости (живота);
- воспаление легких (пневмония);
- инфекции, возникающие во время или после родов;
- осложненные инфекции мочевыводящих путей;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей.

Препарат Цилапенем может применяться для лечения лихорадки, предположительно вызванной бактериальной инфекцией, у пациентов с нейтропенией (низкое количество лейкоцитов в крови).

Препарат Цилапенем может применяться для лечения бактериальной инфекции крови, вызванной любой из перечисленных выше инфекций.

2. О чем следует знать перед применением препарата Цилапенем

Противопоказания

Не применяйте препарат Цилапенем:

- если у Вас аллергия на имипенем или циластатин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас аллергия на другие антибиотики, такие как пенициллины, цефалоспорины или карбапенемы.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите лечащему врачу перед применением препарата Цилапенем.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Цилапенем проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Перед применением препарата сообщите врачу, если у Вас:

- аллергические реакции на любые лекарственные препараты включая антибиотики (серьезные угрожающие жизни аллергические реакции требуют проведения неотложной терапии);
- колит (воспаление слизистой оболочки толстой кишки) или другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания почек, включая снижение функции почек (уровни имипенема+циластатина в крови повышаются у пациентов с пониженной функцией почек. Могут возникнуть нежелательные реакции со стороны центральной нервной системы, если доза не будет скорректирована с учетом функции почек);
- любые нарушения центральной нервной системы, такие как дрожь или эпилептические приступы (судороги);
- заболевания печени.

В период лечения препаратом Цилапенем может быть положительный прямой или непрямой тест Кумбса, который определяет наличие антител в крови, которые могут разрушить эритроциты (см. раздел 4). Ваш врач обсудит это с вами.

Сообщите своему врачу, если Вы принимаете лекарственные препараты, называемые вальпроевой кислотой или вальпроатом натрия (см. «Другие препараты и препарат Цилапенем» ниже).

Дети и подростки

Препарат Цилапенем не следует применять у детей младше 1 года или у детей с нарушением функции почек.

Другие препараты и препарат Цилапенем

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это относится и к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без рецепта.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы применяете:

- ганцикловир (препарат для лечения некоторых вирусных инфекций);
- вальпроевую кислоту/натрия вальпроат (препарат для лечения эпилепсии, биполярного расстройства, мигрени или шизофрении);

- антитромботические препараты для приема внутрь, такие как варфарин;
- пробенецид (препарат для лечения подагры).

Ваш врач решит, следует ли Вам применять препарат Цилапенем в сочетании с этими лекарственными препаратами.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение препарата Цилапенем у беременных женщин не изучалось. Препарат Цилапенем во время беременности следует применять только по назначению врача, если потенциальная польза препарата превышает потенциальный риск для плода.

Если Вы кормите ребенка грудью или планируете начать грудное вскармливание, проконсультируйтесь с врачом перед началом применения препарата. Небольшие количества препарата Цилапенем могут проникать в грудное молоко. Врач определит, можно ли применять препарат Цилапенем во время грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Некоторые нежелательные реакции, связанные с применением препарата Цилапенем (например, галлюцинации, головокружение, сонливость и ощущение вращения), могут повлиять на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами (см. раздел 4).

Препарат Цилапенем содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (15,11 мг) натрия на флакон дозировкой 250 мг, то есть, по сути, «не содержит натрия».

Данный лекарственный препарат содержит 30,23 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) в каждом флаконе дозировкой 500 мг. Это эквивалентно 1,51 % от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

3. Применение препарата Цилапенем

Препарат Цилапенем будет приготовлен и введен Вам врачом или другим медицинским работником. Ваш врач решит, сколько препарата Цилапенем Вам нужно.

Рекомендуемая доза

Доза препарата зависит от вида и тяжести заболевания. Лечащий врач определит необходимую Вам дозу препарата. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Взрослые и подростки

Рекомендуемая доза для взрослых и подростков составляет 500 мг/500 мг каждые 6 часов или 1000 мг/1000 мг каждые 6 или 8 часов. Если у Вас проблемы с почками, врач определит необходимую Вам дозу препарата.

Применение у детей (в возрасте от 1 года и старше)

Рекомендуемая доза для детей от 1 года и старше составляет 15/15 мг или 25/25 мг на 1 кг массы тела. Как правило, препарат вводят каждые 6 часов.

Препарат Цилапенем не следует применять у детей младше 1 года или у детей с нарушением функции почек.

Путь и (или) способ введения

Препарат Цилапенем в дозе ≤ 500 мг+500 мг вводят в виде внутривенной инфузии на протяжении 20-30 минут или 40-60 минут, если доза более 500 мг+500 мг. Если появилась тошнота, то скорость инфузии необходимо снизить.

Если Вам ввели препарата Цилапенем больше, чем следовало

Если Вы предполагаете, что Вам ввели дозу препарата больше, чем назначено, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Симптомы передозировки могут включать: судороги, спутанность сознания, тремор, тошноту, рвоту, низкое артериальное давление и медленное сердцебиение.

Если Вы забыли применить препарата Цилапенем

Если Вы обеспокоены тем, что могли пропустить введение очередной дозы, немедленно обратитесь к своему врачу или другому медицинскому работнику. Не следует вводить двойную дозу для восполнения пропущенной.

Если Вы прекратили применение препарата Цилапенем

Не прекращайте применение препарата Цилапенем, пока Ваш врач не скажет Вам об этом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Цилапенем может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Следующие нежелательные реакции возникают редко, однако если они развиваются во время или после введения препарата Цилапенем, необходимо прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу:

- аллергические реакции, включающие сыпь, отек лица, губ, языка и/или горла (затрудненное дыхание или глотание), низкое кровяное давление;
- серьезные кожные реакции:
 - распространенная сыпь с пузырями и шелушением кожи, особенно вокруг рта, носа, глаз и гениталий (синдром Стивенса-Джонсона), и более тяжелая форма, вызывающая обширное шелушение кожи (более 30% поверхности тела – токсический эпидермальный некролиз);
 - распространенное покраснение и шелушение кожи с отслойкой верхнего слоя кожи (эксфолиативный дерматит);
 - кожная сыпь, которая может образовывать волдыри и выглядит как маленькие мишени (центральные темные пятна, окруженные более бледной областью, с темным кольцом по краю – мультиформная эритема).

Также могут наблюдаться следующие нежелательные реакции:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- повышение количества эозинофилов в крови (эозинофилия);
- отек и покраснение вдоль вены, которая становится очень болезненной при прикосновении (тромбофлебит);
- тошнота, рвота, диарея. Тошнота и рвота чаще возникают у пациентов с низким уровнем лейкоцитов;
- сыпь;
- изменение показателей крови, отражающих работу печени.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- нарушения со стороны крови, затрагивающие клеточные компоненты крови и обычно определяемые с помощью анализов крови – симптомы могут включать усталость, бледность кожи и продолжительные синяки после травмы;
- психические нарушения (например, галлюцинации и помутнение сознания);
- тремор и неконтролируемые подергивания мышц;
- судороги;
- головокружение, сонливость;
- низкое артериальное давление;
- кожный зуд;
- крапивница;
- покраснение кожи в месте инъекции;
- боль и образование уплотнения в месте инъекции;
- лихорадка;
- нарушения функции почек, печени и крови, определяемые с помощью анализов крови.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- воспаление толстой кишки с тяжелой диареей (псевдомембранозный колит);
- кандидоз (грибковая инфекция);
- значительное уменьшение количества белых клеток крови (лейкоцитов), что может привести к снижению иммунитета;
- нарушение функций головного мозга;
- ощущения жжения, покалывания, локализованный тремор;
- искажение вкусовых ощущений;
- потеря слуха;
- окрашивание зубов и/или языка;
- нарушение функции печени;
- гепатит (воспаление печени);
- нарушение функции почек;
- изменение объема выделения мочи, изменение цвета мочи.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- гастроэнтерит (воспаление слизистой оболочки желудка или кишечника);
- воспаление кишечника, при котором наблюдается диарея с примесью крови (геморрагический колит);
- воспаление языка, увеличение сосочков языка, повышенное слюноотделение;
- боль в животе, изжога;
- гемолитическая анемия (нарушение со стороны крови, при котором происходит разрушение эритроцитов (красных клеток крови) с уменьшением их количества в анализах крови);

- изменение количества клеток крови, связанное с угнетением функции костного мозга, где они вырабатываются;
- ухудшение миастении гравис (аутоиммунное заболевание, характеризующееся синдромом патологической мышечной утомляемости);
- головная боль, головокружение (вертиго);
- звон в ушах;
- посинение кожных покровов и слизистых оболочек (цианоз);
- учащение сердцебиения (тахикардия), ощущение сердцебиения;
- приливы крови к лицу, изменение текстуры кожи;
- дискомфорт в грудной клетке, нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся чувством нехватки воздуха, учащенное и поверхностное дыхание, боль в глотке;
- тяжелое поражение печени (фульминантный гепатит);
- повышенное потоотделение, изменение текстуры кожи;
- боль в нескольких суставах, боль в грудном отделе позвоночника;
- слабость;
- зуд половых органов.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- непроизвольные движения мышц (дискинезия);
- возбуждение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, д.13

Телефон: +7 (7172) 235-135

Электронная почта: pdlc@dari.kz

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

Адрес: Ереван 0051, пр. Комитаса 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: 0800-800-26-26

Электронная почта: dlomt@pharm.kg

5. Хранение препарата Цилапенем

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните при температуре не выше 25°C.

Приготовленные растворы следует использовать немедленно! Интервал времени между началом восстановления (приготовления раствора) и окончанием внутривенной инфузии не должен превышать двух часов.

Флакон с лекарственным препаратом предназначен для однократного применения.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Цилапенем содержит

Действующими веществами являются: имипенем; циластатин.

Каждый флакон содержит 250 мг или 500 мг имипенема (в виде имипенема моногидрата).

Каждый флакон содержит 250 мг или 500 мг циластатина (в виде циластатина натрия).

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является: натрия гидрокарбонат.

Препарат Цилапенем содержит натрий (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Внешний вид препарата Цилапенем и содержимое упаковки

Препарат Цилапенем, порошок для приготовления раствора для инфузий, представляет собой порошок от белого до желтого цвета.

По 250 мг имипенема и 250 мг циластатина во флаконы стеклянные вместимостью 100 мл.
По 500 мг имипенема и 500 мг циластатина во флаконы стеклянные вместимостью 200 мл или 100 мл. Флаконы укупоривают пробками резиновыми и обкатывают колпачками алюминиевыми или алюминиевыми/пластиковыми. На каждый флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Упаковка для стационаров: 12 флаконов с одним листком-вкладышем в групповые коробки.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен на русском языке в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте экспертной организации: www.rceth.by.



СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Цилапенем, 250 мг+250 мг и 500 мг+500 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий

Режим дозирования

Рекомендованные дозы препарата Цилапенем соответствуют количеству имипенема/циластатина, которое следует применять.

Суточная доза препарата Цилапенем должна зависеть от типа и тяжести инфекции, выделенного(-ых) возбудителя(-ей) и состояния функции почек у пациента.

Взрослые и подростки

Для пациентов с нормальной функцией почек (клиренс креатинина ≥ 90 мл/мин) рекомендованы следующие схемы применения: 500 мг/500 мг каждые 6 часов или 1000 мг/1000 мг каждые 8 часов или каждые 6 часов.

В случае если инфекция вызвана, или подозревается, что вызвана, менее чувствительными видами бактерий (например, *Pseudomonas aeruginosa*), а также при очень тяжелой форме инфекции (например, пациенты с нейтропенической лихорадкой), рекомендованная доза составляет 1000 мг/1000 мг каждые 6 часов.

Снижение дозы необходимо, если клиренс креатинина составляет < 90 мл/мин (см. таблицу 1). Максимальная суточная доза не должна превышать 4000 мг/4000 мг в сутки.

Особые группы пациентов

Пациенты с нарушением функции почек

Для определения сниженной дозы для взрослого пациента с нарушением функции почек необходимо:

1. определить общую суточную дозу (например, 2000/2000, 3000/3000 или 4000/4000 мг), которая обычно применяется при нормальной функции почек;
2. в таблице 1 найти соответствующую сниженную дозу в зависимости от показателя креатинина у пациента. Время проведения инфузии смотрите в подразделе «Способ применения».

Таблица 1. Дозы цилапенема для взрослых пациентов в зависимости от состояния функции почек на основе клиренса креатинина

Общая суточная доза для пациентов с нормальной функцией почек (мг/сутки)	Клиренс креатинина (мл/минуту)*			
	≥90	<90 - ≥60	<60 - ≥30	<30 - ≥15
	Доза, мг (интервал, часы)			
2000/2000	500 (6)	400 (6)	300 (6)	200 (12)
3000/3000	1000 (8)	500 (6)	500 (8)	500 (12)
4000/4000	1000 (6)	750 (8)	500 (6)	500 (12)
*У пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин применять Цилапенем не следует, если на протяжении 48 часов не проводился сеанс гемодиализа.				

Пациенты, которым проводится гемодиализ

При лечении пациентов, находящихся на гемодиализе с клиренсом креатинина <15 мл/мин, следует применять дозы, рекомендованные для пациентов с клиренсом креатинина 15-29 мл/мин (см. таблицу 1).

Имипенем и циластатин выводятся из системы кровообращения во время гемодиализа. Пациенты должны получать Цилапенем после проведения гемодиализа с 12-часовыми интервалами, начиная с момента окончания сеанса гемодиализа. Следует тщательно контролировать состояние пациентов, которым проводятся сеансы диализа, особенно при имеющемся основном заболевании центральной нервной системы (ЦНС). Для пациентов, которым проводится гемодиализ, препарат Цилапенем рекомендован только в случае, если преимущества применения препарата превышают потенциальный риск возникновения судорожного припадка.

В настоящее время недостаточно данных, чтобы рекомендовать применение препарата Цилапенем у пациентов, которым проводится перитонеальный диализ.

Пациенты с нарушением функции печени

Пациентам с нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется.

Пациенты пожилого возраста

Пациентам пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекция дозы не требуется.

Дети в возрасте ≥1 год

Для детей в возрасте ≥ 1 года рекомендованная доза составляет 15/15 или 25/25 мг/кг каждые 6 часов.

В том случае, если инфекция вызвана или подозревается, что вызвана, менее чувствительными видами бактерий (например, *Pseudomonas aeruginosa*), а также при очень тяжелой форме инфекции (например, пациенты с нейтропенической лихорадкой), рекомендованная доза составляет 25/25 мг/кг каждые 6 часов.

Дети в возрасте <1 года

Недостаточно клинических данных, чтобы дать рекомендации по дозированию препарата для детей в возрасте младше 1 года.

Дети с нарушениями функции почек

Недостаточно клинических данных, чтобы дать рекомендации по дозированию препарата для детей с нарушениями функции почек (уровень сывороточного креатинина >2 мг/дл).

Способ применения

Перед применением Цилапенем необходимо восстановить и затем разбавить (см. «Правила приготовления, введения и хранения раствора лекарственного средства»). Дозу ≤ 500 мг+500 мг следует вводить в виде внутривенной инфузии на протяжении 20-30 минут. Дозу >500 мг+500 мг следует вводить в виде внутривенной инфузии в течение 40-60 минут. Пациентам, у которых возникает тошнота во время проведения инфузии, следует снизить скорость инфузии.

Правила приготовления, введения и хранения раствора лекарственного средства

Каждый флакон с лекарственным средством предназначен для однократного применения.

Содержимое каждого флакона необходимо перенести в 50 мл (для дозировки 250 мг+250 мг) или 100 мл (для дозировки 500 мг+500 мг) соответствующего инфузионного раствора – 0,9% раствора натрия хлорида. В исключительных случаях, когда 0,9% раствор натрия хлорида не может быть использован по клиническим причинам, вместо него может использоваться 5% раствор глюкозы.

Предлагаемая процедура приготовления заключается в добавлении приблизительно 10 мл соответствующего инфузионного раствора во флакон с лекарственным средством. Полученную смесь необходимо хорошо встряхнуть и перенести в контейнер с инфузионным раствором.

ПОЛУЧЕННУЮ СУСПЕНЗИЮ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ!

Повторить процедуру с дополнительными 10 мл из того же инфузионного контейнера, чтобы обеспечить полный перенос содержимого флакона в инфузионный раствор. Полученную в инфузионном контейнере смесь следует встряхивать до образования прозрачного раствора.

Концентрация имипенема и циластатина в приготовленном растворе составляет около 5 мг/мл.

Приготовленные растворы следует использовать немедленно! Интервал времени между началом восстановления (приготовления раствора) и окончанием внутривенной инфузии не должен превышать двух часов.

Вариации цвета раствора от бесцветного до светло-желтого не влияют на эффективность лекарственного средства.

Несовместимость

Препарат химически несовместим с лактатом, и его нельзя разводить в растворах, содержащих лактат.

Этот лекарственный препарат нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами, кроме указанных выше в разделе *«Правила приготовления, введения и хранения раствора лекарственного средства»*

Утилизация

Неиспользованное лекарственное средство или отходы должны быть утилизированы в соответствии с установленными национальным законодательством требованиями.

Пожалуйста, за дополнительной информацией касательно применения препарата обратитесь к ОХЛП (общая характеристика лекарственного препарата), размещенной на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <http://eec.eaeunion.org/>.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com